

El fentanilo: una droga mortal que desafía a la sociedad

- Este medicamento es significativamente más potente que la morfina y otros opiáceos El uso indebido o inadecuado del fentanilo puede ser muy peligroso Debe ser recetado y administrado por profesionales de la salud en situaciones clínicas adecuadas



El fentanilo: una droga mortal que desafía a la sociedad

Fentanilo Drogas Opiáceo Medicamentos Medicina Médico Adicciones sobredosis tratamientos tratamiento

<https://www.elcorreogallego.es/sociedad/2023/10/26/fentanilo-droga-mortal-desafia-sociedad-93821775.html>

Javier Rosende Novo

Jueves, 26 octubre 2023

Se puede administrar de varias formas:

- **Parches transdérmicos:** Estos parches se aplican en la piel y liberan el fentanilo lentamente a lo largo del tiempo para proporcionar alivio continuo del dolor.
- **Pastillas o tabletas bucales:** Se disuelven en la boca y se absorben a través de las membranas mucosas.
- **Inyecciones:** El fentanilo también se puede administrar por vía intravenosa en entornos médicos.

El uso indebido o inadecuado del fentanilo puede ser peligroso y llevar a una sobredosis potencialmente mortal debido a su alta potencia. En los últimos años, el fentanilo ha sido motivo de preocupación en la epidemia de opiáceos en algunos lugares, ya que es a menudo fabricado ilegalmente y mezclado con otras drogas, lo que puede aumentar el riesgo de sobredosis.

Al ser un potente analgésico opiáceo, tiene una serie de efectos, tanto terapéuticos cuando se usa adecuadamente bajo supervisión médica, como efectos secundarios y riesgos cuando se abusa o se utiliza de manera inapropiada.

Efectos terapéuticos:

- **Alivio del dolor:** El efecto principal y deseado del [fentanilo](#) es el alivio del dolor. Se utiliza en situaciones de dolor intenso, como después de una cirugía importante, para controlar el dolor crónico en pacientes que no responden a otros analgésicos, o para aliviar el dolor en cuidados paliativos.

Efectos secundarios comunes:

- **Sedación:** El [fentanilo](#) puede causar somnolencia o sedación, lo que puede afectar la capacidad de una persona para concentrarse o realizar tareas que requieren atención.
- **Estreñimiento:** Es común que los opiáceos, incluyendo el [fentanilo](#), causen estreñimiento.
- **Náuseas y vómitos:** Algunas personas experimentan náuseas y vómitos como efectos secundarios del [fentanilo](#).
- **Mareos y confusión:** El [fentanilo](#) puede provocar mareos y, en algunos casos, confusión o dificultades cognitivas.
- **Depresión respiratoria:** Uno de los riesgos más serios asociados con el [fentanilo](#) es la depresión respiratoria, que puede llevar a una disminución en la frecuencia respiratoria. Esto puede ser potencialmente mortal si la dosis es demasiado alta.

Riesgos y efectos ddversos:

- **Sobredosis:** El uso inadecuado o el abuso del [fentanilo](#) pueden conducir a una sobredosis, que puede ser potencialmente mortal. Los síntomas de una sobredosis de [fentanilo](#) incluyen dificultad para respirar, confusión, pupilas contraídas y, en casos graves, coma.
- **Adicción y Dependencia:** El [fentanilo](#) es altamente adictivo, y su uso a largo plazo puede llevar a la dependencia física y psicológica.
- **Retirada:** Cuando se suspende el uso de [fentanilo](#) después de un uso prolongado, se pueden experimentar síntomas de abstinencia, que incluyen ansiedad, insomnio, sudoración, escalofríos y dolores musculares.

Es importante subrayar que el [fentanilo](#) **debe ser recetado y administrado por profesionales de la salud** en situaciones clínicas adecuadas. Su uso inapropiado o ilegal, como en el caso de [fentanilo](#) de fabricación no farmacéutica, puede tener graves consecuencias para la salud y la seguridad.